

## Nota Técnica: Palpação abdominal



Por: Kassy G. da Silva – Médica Veterinária

Mestranda em Ciência Animal PUCPR

E-mail: [kgomes13@hotmail.com](mailto:kgomes13@hotmail.com)

O diagnóstico precoce de gestação é muito importante em várias espécies animais, como vacas, éguas, cabras e ovelhas. E com a coelha não é diferente. Se o produtor descobrir que a coelha não está prenhe antes dos 30 dias de gestação, é possível adiantar o próximo acasalamento e não perder tempo esperando a coelha parir uma ninhada que não existe. E como é possível saber antes dos 31 dias? A palpação abdominal é uma das alternativas. É um método rápido, eficaz e de baixo custo, sendo necessário somente treino do examinador. É mais comum realizar o exame no intervalo de 12 a 14 dias de gestação, sendo que também pode ser feito mais cedo, aos 10 dias, ou mais tarde, aos 15 dias de gestação. O exame consiste na colocação de uma mão aberta no ventre da coelha, e em movimentos suaves para frente e para trás, com o dedo polegar de um lado e os dedos indicador e médio do outro. Se a coelha estiver prenhe, o examinador sentirá várias “bolinhas”, semelhante ao formato de azeitonas, seguidas umas das outras, como um colar de pérolas. Deve-se tomar cuidado para não confundir com as fezes da coelha. Para tirar a dúvida, pode-se repetir o exame alguns dias depois, no qual o produtor perceberá que as bolinhas continuam ali e estão um pouco maiores. Outro cuidado é que o exame deve ser feito de forma suave, para não machucar nem a fêmea nem os filhotes. Depois de algum tempo, o produtor ficará mais experiente e levará pouco tempo para examinar cada animal. Com esse método é possível melhorar a produção da granja, já que é possível saber quantos animais estão realmente prenhes e quantas fêmeas podem ser acasaladas novamente após o diagnóstico de gestação negativo. Assim o produtor ganha tempo e faz com que sua granja seja mais eficiente.